

جدول الاصابات المهنية وتقدير نسب العجز الذي ينشأ عنها ملحق بقانون العمل رقم 2 لسنة 1996
المنشور على الصفحة 1220 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4113 بتاريخ 16/4/1996

المادة 1

قائمة بالاصابات المهنية وتقدير نسب العجز الذي ينشأ عنها

النسبة المئوية		الاطراف
شمال	يمين	عضو او جزء من العضو
(الاطراف العليا اليد والساعد والعضد)		
8	15	فقد سلامة الابهام
12	15	فقد سلامة ونصف
20	25	فقد جميع السلاميات
24	30	فقد جميع سلاميات وعظمة مشط الابهام
12	15	فقد السبابة
10	12	فقد الوسطى
7	9	فقد البنصر
6	8	فقد الخنصر
33	45	فقد الابهام والسبابة
18	22	فقد السبابة والوسطى
15	18	فقد الوسطى والبنصر
18	22	فقد الخنصر والبنصر
30	45	فقد الوسطى والخنصر
33	45	فقد الابهام والبنصر والوسطى
25	35	فقد البنصر والوسطى والسبابة
27	33	فقد الوسطى والبنصر والخنصر
36	45	فقد السبابة والخنصر والبنصر
36	45	فقد الابهام والسبابة والخنصر
33	45	فقد السبابة والوسطى والخنصر
33	45	فقد الابهام والبنصر والخنصر
45	55	فقد الابهام والسبابة والوسطى والبنصر
45	55	فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام
45	55	فقد جميع الاصابع ما عدا السبابة
55	60	فقد اصابع اليد جميعها
60	65	فقد اليد جميعها
15-5	15-5	انكلوز جزئي في الرسغ
18	25	انكلوز تام في الرسغ
60	70	بتر الساعد اسفل المرفق
66 2/3	75	بتر الساعد من المرفق
66 2/3	75	بتر نصف العضد
75	80	بتر الذراع من الكتف
100	100	بتر الذراعين
40-30	50-40	انكلوز تام في الكتف
25-20	35-25	انكلوز غير تام في الكتف
35	30	تعود الخلع في الكتف
15	25	نقص في حركة الذراع لموازاة الكتف
5	15	نقص في حركة الذراع لدرجة 30
20	30	شلل العضلة الدالية

25	30	شلل العضلة ذات الراسين
40	50	كسر غير ملتحم بالعضد
40	50	تبيس المرفق مع بسط بدرجة 180
35	40	تبيس بالمرفق في زاوية 150
25	30	تبيس بالمرفق في زاوية 90
40	50	مفصل المرفق المفكوك
15	25	مرفق لا يتحرك الا بين درجتين 90 و100
5	15	كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقي
40	50	كسر في الساعد مع اعاقه تامه في حركتي الكب والبطح
10	12	كسر بالتحام معيب قليلا بعظم الزند عائق لمفصل الرسغ بمقدار الربع
12	15	كسر بعظم الزند والالتحام به عيب شديد واعاقه الرسغ الثالث
20	25	انكلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل

المادة 2

الاطراف

النسبة المئوية
يمين شمال

عضو او جزء من العضو

(الاطراف السفلى) القدم والساق والفخذ

8	8	فقد ابهام القدم
12	12	فقد الابهام والاصبعين التاليين
12	12	فقد جميع الاصابع ما عدا الابهام
20	20	فقد اصابع القدم جميعها
2	2	فقد سلامية واحدة من الابهام
	2	فقد الاصبع الثاني والثالث او الرابع او الخامس
30	30	فقد القدم والاصابع والمشطيات
25	25	عملية ليفرانك
35	35	فقد القدم عملية شوبار
50	50	فقد القدم من الثلث الاخير من الساق وعولج بعملية بتر
65	65	فقد الساق من مفصل الركبة
66 2/3	66 2/3	فقد الطرف السفلي حتى الثلث الاخير من الفخذ
75	75	فقد الطرف السفلي حتى اسفل المفصل الحرقفي
80	80	فقد الطرف السفلي من المفصل الحرقفي
50	50	تبيس المفصل الحرقفي في وضع مناسب
30	30	كسر عظم الفخذ مع قصر 6 سم والمفاصل جيدة
12	12	كسر عظم الفخذ مع قصر 4 سم
8	8	كسر عظم الفخذ مع قصر 3 سم
50	50	انكلوز الركبة لدرجة 100
20	25	انكلوز الركبة تتحرك لدرجة 120 - 170
15	15	انكلوز الركبة تتحرك لدرجة 90 - 180
30	30	كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعيف شديد بالفخذ
20	20	كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعف بالفخذ
25	25	التهاب مفصلي ركبي تشوي
50	50	كسر غير ملتحم في الساق
20	20	كسر مزدوج في الساق بشكل (×)
20	20	انكلوز رسغ القدم في زاوية قائمة (احسن وضع)
33 1/3	33 1/3	انكلوز رسغ القدم في زاوية 100
50	50	انكلوز في الكعب مع رفع القدم لاعلى

15	15	القدم المفرطحة نتيجة كسر العظام
15	15	تبيس ابهام القدم مع تعطيل حركة القدم
15	15	انكلوز في اصابع القدم في وضع جيد
50	50	صك تام جنوفالجم Genvualgem
25	25	دوالي مع تقرح

المادة 3

النسبة المئوية
يمين شمال

الاطراف
عضو او جزء من العضو

العضلات

30	30	1. فقد جزء من العضلات سواء عضلة واحدة او عدة عضلات مصحوب بالتصاق متسع مع الجلد او ما تحته من الانسجة
		2. تمزق كامل او جزئي لعضلة واحدة.
		3. تمزق كامل او جزئي لوتر مصحوب بضمور العضلات .
20	20	أ . ضمور عضلات الفخذ كلها
30	30	ب. ضمور عضلات الجزء الامامي للفخذ
10	10	ج. ضمور الساق جميعها
40	40	د. ضمور عضلات الجزء الامامي للساق
		هـ. ضمور عضلات الطرف السفلي .

المادة 4

النسبة المئوية
يمين شمال

الاطراف
عضو او جزء من العضو

الاعصاب

		شلل نتيجة اصابة اعصاب الاطراف
25	30	شلل العصب الزندي (اصابة العصب في مستوى المرفق)
15	20	شلل العصب الزندي (الاصابة عند اليد)
40	50	شلل العصب الكعبري (اصابة العصب اعلى الذراع للعضلة المثلثة الرؤوس)
65	75	شلل الثلاثة اعصاب الوسطى والزندي والكعبري
8	10	شلل عصب تحت اللوح
15	20	شلل العصب الدائري
55	70	شلل تام باعصاب الطرف العلوي
50	50	شلل تام باعصاب الطرف السفلي
30	30	شلل العصب الوركي المابضي الوحشي
30	30	شلل العصب الوركي المابضي الانسي
60	60	شلل العصب الوركي المابضي الوحشي مصحوب بالم
40	40	شلل العصب الوركي المابضي الوحشي والانسي
50	50	شلل العصب الفخذي
50	50	التهاب العصب الوركي التام
20	20	شلل العصب الشظري

المادة 5

الاطراف النسبة المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

الاوعية الدموية

1. الاصابة او المرض اما ان تشفى بالتدخل الجراحي او ينشأ عنها عاهة تتوقف درجتها على درجة العجز الناشيء عنها .
2. انسداد الاوعية الدموية اصابي
انسداد الشرايين جراحي عدوى
أ . ضمور طرف مع تيبس بالمفاصل 10% 40%
ب. اصابة احد الاعصاب انظر الاعصاب
ج. غنغرينا بالاطراف انظر حالات البتر
3. انسداد الاوردة
أ . اوزيما مزمنة 10% 30%
ب. انسداد بالطرفين السفليين مع
اوزيما مزمنة تؤثر على المشي والوقوف 20% 50%

المادة 6

الاطراف النسبة المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

دوالي الساقين

- ان وجود الدوالي لا ينشأ عنها عجز يمكن تقدير نسبته المئوية
مضاعفات الدوالي
يمكن شفائها بتدخل جراحي او يتسبب عنها :
قرحة متسعة 20% 30%
اوزيما متسعة انظر السداد الوريدي

المادة 7

الاطراف النسبة المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

الدماغ

- فقد شعر فروة الرأس 5 15%
فقد عظمي يشمل الصفيحة الخارجية
والداخلية اتساعه اصغر من مساحة 5 سم 5 20%
فقد عظمي 2 سم 2 8%
فقد عظمي $2 \times 1 \frac{1}{2}$ سم 8 10%
فقد عظمي 3×2 سم 10 12%

فقد عظمي 3×4 سم 1 20%
فقد عظمي 4 1/2×4 سم 10 20%
فقد عظمي اكبر اتساعا من مساحة 5 سم 2
وشاملا صفيحتي العظام الداخلية والخارجية 20 40%
مع وجود نبضات المخ
اصابة الدماغ مصحوبة او غير مصحوبة
بكسر بعظام الراس مع صداع وبعض لعثمة
في الكلام واعراض دماغية 5 20%
اصابة الدماغ مثل السابقة - ولكن مع بعض
نقص في القوى العقلية قد تصل الى درجة الجنون العام 100 %
نوبات صرعية متعددة 40 80%
نوبات صرعية قليلة او نادرة 20 30%

المادة 8

الاطراف النسبية المؤوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

شلل الطرفين العلويين

شلل تام بالذراع الايمن 70 %
شلل تام بالذراع الايسر 60 %
شلل غير تام بالذراع الايمن 20 50%
شلل غير تام بالذراع الايسر 15 30%

المادة 9

الاطراف النسبية المؤوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

شلل الطرفين السفليين

شلل الطرف السفلي مع القدرة على المشي 20 40%
شلل نصفي عام مصحوب بتوتر العضلات 70 100%
شلل نصفي غير تام او غير مصحوب بتوتر العضلات 10 60%
شلل نصفي ايمن غير تام 18 60%
شلل نصفي ايسر غير تام 8 40%
افازيا واضحة 60 80%
افازيا مع شلل نصفي غير تام 100 %
افازيا بسيطة 10 30%
نزيف مخي مصحوب بشلل نصفي غير قابل للشفاء 100 %
ارتجاج دماغي مع دوخة 40 60%
خراج بالمخ مع صداع شديد وصرع 30 60%
رض بالدماغ مصحوب او غير مصحوب
بكسر بالجمجمة مع دوخة وطنين وصداع
تغييرات في الوظائف العقلية 20 60%
مرض عقلي حاد 10 100%
مرض عقلي مزمن 10 80%

المادة 10

الاطراف النسبية المؤوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

المرض العقلي الاصابي عقب الارتجاج الدماغى او اصابة بالمخ

1. تستدعي علاج المصاب بمستشفى الامراض العقلية . 100 %
2. لا تستدعي علاجه او مراقبته . 80 %
3. حالة ذات اعراض مناخوليا او عتاهة . 10 %
ارتعاشات انفعالية . 20 30 %
ارتعاشات نتيجة ارتجاج المخ . 20 50 %
ميل العنق التشنجى . 20 40 %

المادة 11

الاطراف النسبية المؤوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

العينان

- ضعف في قوة ابصار العين لغاية الثلث . صفر 10 %
1. فقد الابصار غير قابل للعلاج .
يدخل في هذا الباب انعدام او ضمور
مقلة العينين-العتامات المتسببة عن
اثر الالتئام شاملة اغلب القرنية -
الضمور التام للعصب البصري -
التلف الناشئ عن اثر الالتئام بالعصب
الخلفى للمشيمة الشبكية وانفصال الشبكية 90 .
ويعتبر من الناحية العملية فاقد الابصار
عندما لا يتعدى الابصار المركزي نصف متر أي
يمكن تمييز اصابع اليد على مسافة نصف متر
ويكون ميدان النظر اقل من نصف متر او منعدما من الناحية
الاخرى .
 2. فقد ابصار احدى العينين مع سلامة العين الاخرى .
يجب ان تميز حالات فقد الابصار بدون تلف ظاهر
وحالات التشويه (استئصال او ضمور مقلة العين و
وعنبة متسعة) .
أ. فقد الابصار بدون تشويه ظاهر . 25 %
ب. استئصال مقلة العين او ضمورها مع تشويه ظاهر 30 %
لا يمنع من وضع عين صناعية .
ج. استئصال مقلة العين مع اثر التئام يمنع من وضع
عين صناعية . 40 %
 3. الابصار المركزي - نقص او فقد ميدان النظر بالعينين .
 1. ضيق ميدان النظر الى 30 درجة .
أ . لعين واحدة . صفر %
ب. عينين . 20 %
 2. ضيق ميدان النظر لاقل من 10 درجات . 10 %
أ . في عين واحدة . 10 %
ب. في عينين . 70 80 %

3. اسكوتوما (Scotoma) مركزية حسب اتساعها .

أ . عين واحدة . 15 20%

ب . عيني . 70 100%

4. فقد النصفين المتماثلين (Hemiahpia) .
في ميدان النظر : مع الاحتفاظ بقوة الابصار المركزية :

أ . فقد ميدان النظر بالراس :

1. نصف الميدان المتماثل ايمن وايسر بالعينين 25 %

2. فقد ميدان النظر الانفي 10 %

3. فقد نصف ميدان النظر الصدغي 40 %

ب . فقد ميدان النظر الافقي علوي 40 %

سفلي 50 %

للربع 10 %

ج . ازدواج البصر (Diploopia) 25 %

اصابات اخرى بالعينين . النسبة المئوية

1. شلل للتكيف وشلل العضلة القابضة للقزحية :

أ . الشلل الداخلي التكيفي للعين الواحدة 5%- 10%

ب . الشلل الداخلي التكيفي للعينين . 10%- 20%

2. كتار كتنا اصابية :

عندما تكون قوة ابصار العين اقل من السليمة

مما يسبب عدم اندماج الصورتين يزداد 10%

بحيث لا تتعدى درجة العاهة 25% بمثل العاهة المتخلفة عن فقد ابصار العين الواحدة .
فمثلا :

أ . قوة ابصار - العين اليمنى السليمة 6 / 6

وقوة ابصار العين اليسرى بعد العملية 6 / 6 الى 6 / 12

ب * 10 ديوبتر تتكون العاهة .

ب . قوة ابصار العين اليسرى السليمة 10 %

وقوة ابصار العين اليسرى بعد العملية 6 / 6 25 60 %

او اقل فتكون العاهة

وان خلع العدسة او نزيف داخل العين او انفصال الشبكية قابل

للتغيرات والتطورات وذلك تقدر العاهة حسب درجة الابصار

فقد العدسة في عين واحدة 10 - 20%

فقد العدستين معا 20- 40%

عظم الحجاج :

أ . تلف عظم الحجاج وبعض محتوياته (مقلة العين والجيوب حولها والحفرة الانفية) مصحوب بتشوه لا يمكن اصلاحه او وضع عين صناعية .

ب . الاعصاب المحركة 50- 70%

شلل عضلة او اكثر منتج عنه ازدواج البصر 25 %

ج . اعصاب الحساسية :

التهاب باطراف الاعصاب مع خزل او تقلص

عضلات الوجه مصحوبة بالم 15- 20 %

د . شلل العصب التوامي الثلاثي (العصب الخامس) 10- 30%

هـ . تغييرات الاوعية الدموية - انيورزم واورام 20- 60%

نابضة بالحجاج الجفون .

1. انحراف حافة الجفن (للداخل او الخارج) او الشعرة او اثر الالتئام الرديئة

او التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة سواء كانت كلية او جزئية حسب

اتساعها . صفر - 10%

2. عدم القدرة على غلق جفني العينين بسبب شلل العصب الوجهي .

- أ . عين واحدة حسب المضاعفات . 10- 20%
ب. عينيْن حسب المضاعفات المسالك الدمعية 30- 50%
زيادة التدميع
ناسور دمعي مع اصابات متسعة بالعظم من ناحية 30%
من ناحيتين . 40%

المادة 12

الاطراف النسبية المئوية

عضو او جزء من العضو يمين شمال

الانف

التشويه

- كسر عظم الانف مع ضيق الخياشيم . 15%
فقد الانف بدون ضيق الخياشيم . 20%- 40%
فقد اذنية الانف . 10%
فقد جزئي بالانف بدون ضيق خياشيم 10%- 20%
فقد بالانف مصحوب بضيق الخياشيم 20- 50%
ضيق الانف بدون فقد
1. اذا لم يعالج الضيق تتراوح درجة العجز
ما بين 5- 25%
2. شلل تام بعصب الشم دون اصابات ظاهرة باعلى
الحفرة الانفية . 5- %

المادة 13

الاطراف النسبية المئوية

عضو او جزء من العضو يمين شمال

الاذنان

الاذن الخارجة

- فقد او تشويه بصيوان الاذن بدون اصابة
المجرى السمعي 5%
اذن واحدة 5%
اذنان 10%
فقد صيوان الاذن مصحوب بضيق المجرى السمعي .
يضاف لدرجة العجز المنوه عنها بعاليه درجة بسبب ضعف السمع او انعدامه

الاذن الوسطى

- صمم غير كامل : من ناحية واحدة 5%- 10%
من الناحيتين 15%- 40%
صمم كامل : من ناحية واحدة 30%
من الناحيتين 60%
صمم كامل من ناحية و غير كامل من
الناحية الاخرى 30%- 50%
التهاب عظمي نخاعي
التهاب عظمي نخاعي قيحي بالصدغي مصحوب
بناسور فاذا لم يشف يتداخل جراحي يراعى تقرير العاهة
حسب درجة الالتهاب العظمي النخاعي

التهاب عظمي ذرفي بالصدغي 30%- 50%
الدوخة الشديدة المستمرة 10%- 30%
صمم اذن واحدة 15%
صمم اذن وحيدة 30%

المادة 14

الاطراف النسبية المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

الاسنان

فقد لغاية ثلاثة اسنان صفر 5%- 5%
فقد نصف الاسنان مع امكان تركيب طقم
صناعي 10%
فقد نصف الاسنان مع عدم امكان تركيب
طقم صناعي 25%
فقد الاسنان جميعها مع امكان تركيب
طقم صناعي 15%
فقط الاسنان جميعها مع عدم امكان
تركيب طقم صناعي 40%- 50%

المادة 15

الاطراف النسبية المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

الوجه

تشوهات الوجه :
اصابة الفك العلوي وتشوه الانف
(حسب حالة الانسجة الرخوة) 80%- 90%
اصابة الفك العلوي مع تشوه الوجه 90%
اصابة الفك السفلي باكمله او عندما
لا يبقى خلاف 60%- 80%
الفرع المساعد مع تشوه الوجه

المادة 16

الاطراف النسبية المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

الفك العلوي

المضغ غير ممكن 40%- 50%
المضغ ممكن ولكنه محدود 10%- 20%
فقد بسقف الحلق 10%- 30%
فقط بسقف الحلق بتحسن بالعلاج
الجراحي صفر - 10%
فقط بسقف الحلق متصل بالحفرة
الانفية مع تشوه بالوجه 30%- 50%
فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة
الانفية بتحسن بالعلاج 10%- 40%

فقد بسقف الحلق متصل بالحفرة
الانفية وجيب الهواء الفكي 30% - 40%

المادة 17

الاطراف النسبة المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

الفك السفلي

المضغ غير كاف او غير ممكن 40% - 60%
المضغ ممكن نوعا 5% - 10%
خلع بالمفصل الفكي الصدغي ولا
يمكن رده 20% - 30%
خلع بالمفصل الفكي الصدغي
يتحسن بالعلاج صفر % - 10%
ضيق الفم بسبب انكلوز الفكين 20%
ضيق الفم بسبب انكلوز الفكين
بحيث لا يتناول غير السوائل 25%

المادة 18

الاطراف النسبة المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

اللسان

بتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة الكلام 10% - 40%
ناسور لعابي لم يتحسن بالعلاج الجراحي 10% - 40%

المادة 19

الاطراف النسبة المئوية
عضو او جزء من العضو يمين شمال

العامود الفقري

انحراف الراس والجزع 20% - 50%
سكوليوز او لردوز او كيفوز مع قيد الحركات 30% - 50%
بروز او انخساف موضعي مصحوب بالالم وقيد بالحركات 10% - 30%
شلل الطرفين السفليين 100%
شلل الطرفين السفليين غير كامل والمشي غير ممكن 70%
شلل الطرفين السفليين غير كامل والمشي ممكن بعكاز او عصا 30% - 50%
التهاب عظمي مفصلي تشوهي 30% - 40%
التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس 40% - 80%
مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس
التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع سلامة النخاع الشوكي 30% - 60%
مرض بوت غير مصحوب بخراج درني 30% - 50%
مرض بوت مصحوب بخراج درني 50% - 70%
تكهف الحبل الشوكي 50% - 70%
ضمور العضلات المطرد 10% - 80%
تليف الجهاز العصبي المركزي المنتور 60% - 70%

المادة 20

الاطراف النسبية المؤوية

عضو او جزء من العضو يمين شمال

الحوض

الام مع صعوبة المشي والحركة 10% - 20%
قصر الطرف السفلي وانحراف بمحوره 20% - 40%

المادة 21

الاطراف النسبية المؤوية

عضو او جزء من العضو يمين شمال

العنق

انثناء العنق للامام نتيجة شد العضلات او اثره التنام ملتصقة 10% - 20%
انثناء العنق بحيث تصل الذقن لاعلى عظم القص 40% - 60%

المادة 22

الاطراف النسبية المؤوية

عضو او جزء من العضو يمين شمال

الحنجرة

ضيق الحنجرة :
بحة الصوت 5% 20%
ضيق التنفس عقب المجهود 10%
ضيق التنفس بدون اجراء مجهود 30%
ضيق التنفس يستدعي وضع انبوبة حنجرة 40%
بحة بالصوت مصحوبة بضيق تنفس 16% 60%
درن الحنجرة 20%
انعدام الصوت مع تلف محدود بالاو تار الصوتية 50%
صعوبة البلع مع او بدون انعدام الصوت 9%
ضيق التنفس والحنجرة مع فتحة حنجرية 100%

المادة 23

الاطراف النسبية المؤوية

عضو او جزء من العضو يمين شمال

الحلق

ضيق الحلق السفلي والبلعوم :
ضيق الحلق يعيق البلع 10% 30%
ضيق البلعوم 20% 50%
ناسور البلعوم مصحوب بضيق غير قابل للشفاء بجراحة 10% 30%

ضيق او انسداد الحلق العلوي :
برزخ حلقي بلعومي من التصاق سقف الحلق بالجدار الخلفي 15% 40%
برزخ حلقي مصحوب بصمم 60%

المادة 24

الاطراف النسبية المئوية

عضو او جزء من العضو يمين شمال

القفص الصدري

كسر عظم الغير مصحوب باصابة خشوية 10% 20%
كسر ضلع صفر 20%

الرتان

الدرن الرئوي :

درن رئوي نتيجة عدوى مهنية او عقب اصابة
الحالات البسيطة 10% 20%
الحالات المتوسطة 30% 70%
الحالات المتقدمة 70% 90%

الالتهاب الشعبي المزمن

التهاب شعبي مزمن - مضاعف بانفزيما وفشل القلب وريو 90%
التهاب شعبي بسيط 5% 20%
ارتشاح بلوري بسيط 5% 30%
انسكاب دموي بلوري 5% 20%
انسكاب صديدي بلوري 10% 50%

القلب والاورطي

التصاق بغشاء القلب او اصابة بصمام القلب او التهاب بعضلات القلب :

والقلب متكافىء 10% 15%
مع اعراض ظاهرة 20% 60%
مع عدم تكافؤ القلب 80%
تأثير القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى او تسمم 30% 90%
انيورزم الاورطي 40% 80%

تابع الجدول رقم 2

البطن

المعدة :

قرحة مزمنة 30% 50%
قرحة مزمنة مصحوبة بضيق البواب وتمدد المعدة وجفافه 50% 80%
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة 10% 40%

قرحة مزمنة مع ناسور معدي لم يسعف بالعلاج الجراحي 50% - 90%
قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء الدقاق لم تشف بالعلاج 20% - 30%
- ناسور ضيق

قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء - ناسور متسع في 40% - 70%
البطن منخفض

قرحة مزمنة مع ناسور بالامعاء - ناسور في وضع مرتفع 70% - 90%

ناسور بالامعاء الغلاظ لم يشف بالعلاج الجراحي :

1. ناسور ضيق / يسمح بخروج الغاز وبعض السوائل 20% - 30%
2. ناسور يسمح بخروج بعض مواد برازية والتبرز عادي 30% - 40%
3. شرج صناعي / يخرج منه جميع محتويات الامعاء والتبرز معدوم 80% - 90%

ناسور شرجي حسب موضعه خارج او داخل العضلة العاصرة :

- مع عدم القدرة على حجز البراز او احتباس المواد البرازية 10% - 40%
نتيجة اصابة العضلة العاصرة مع عدم اصابة العضلة العاصرة
او فتحة الشرج مصحوب او غير مصحوب بسقوط الشرج 20% - 70%
مع التهاب معوي 20% - 70%
مع دستاريا مؤقتة 20% - 50%
مع التهاب بريوني درني 30% - 70%

الفتق الاصابي

1. فتق اربي 10% - 20%
2. فتق فخذي 10% - 30%
3. فتق مزدوج 20% - 30%
4. فتق سري 10% - 20%

جدار البطن

- اثره التنام مصحوبة بفتق 10% - 30%
اثره التنام مصحوبة بفتق محدود 10% - 20%
اثره التنام مصحوبة بفتق (بفتق جراحي) 30% - 60%
فتق او تفتق (Invention) بدون اثره التنام 10% - 40%
فتق جراحي (Incisional Hernia) 10% - 20%
فتق جراحي بطني مصحوب او غير مصحوب 20%
بشلل جزئي لعضلات البطن

الكبد

ناسور مراري او صديدي اصابي او عقب جراحة 20 - 60%

الطحال

استئصال الطحال 20% - 50%

المسالك البولية

التهاب باحدى الكليتين 10% 30%
التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية 40% 50%
التهاب كلوي بسبب عدوى او تسمم 50% 80%
التهاب بحوض الكليتين 50% 80%
استئصال الكلية 50%
استئصال الكلية مصحوبة بفتق جراحي 60% 70%
ناسور بطني بولي 40% 60%
ناسور بالحالب 50%
كلية متحركة 5% 10%
درن بكلية واحدة 50%
درن بالكليتين 60% 80%
درن بالمثانة مع سلامة الكليتين 20% 30%

المثانة

التصاق جدار المثانة بالارتفاق العاني بسبب كسر 40% 50%
ناسور اسفل منطقة العانة 50%
ناسور بولي 50%
ناسور مثاني معوي 70%
ناسور مثاني شرجي 50% 90%
التهاب مثاني مزمن اصابي او نتيجة ادخال مجس 30% 40%
متكرر او جرح بالمثانة استدع تثبيت قسطرة
التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة 50%
التهاب مثاني مع التهاب بحوض كليتين 70% 90%
انحباس كلي بالبول نتيجة اصابة النخاع الشوكي 40%
انحباس جزئي بالبول 20%
انحباس جزئي بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة او كليتين 50% 90%
عدم القدرة على حجز البول 20% 30%

قناة كمجرى البول الخلفي

ضيق كامل نتيجة تمزق قناة مجرى البول الخلفي 95%
ضيق نتيجة تمزق جزئي 60%
ضيق يمكن توسيعه بعملية جراحية 20% 40%
ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة مجرى البول 60% 80%
ضيق مصحوب بانعدام العضلة العاصرة للشرج وعدم القدرة على حجز البراز 80% 90%

قناة مجرى البول الامامي

ضيق اصابي يمكن توسيعه 20% 30%
ضيق يصعب توسيعه 30% 40%
ناسور بولي 30%
انعدام قناة مجرى البول الامامي مع فتحة بالعجان 70%
انعدام قناة البول الامامي مع فتحة ما بين السرة والعانة 40%

اعضاء التناسل

فقد القضيب 60%
فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول 70%
انعدام جزئي بالجسم الاسفنجي 30%
اثر التنام بالقضيب لا تمنع الانتصاب صفر%
فقد ثمرة القضيب 25%
فقد القضيب مع قناة مجرى البول الامامي والسفلي مع الخصيتين 90%
فقد خصية مع مظاهر نقص الهرمونات 10%
فقد خصية قبل البلوغ 33 1/3%
فقد خصية لغاية سن الاربعين 20%
فقد خصية في سن 40 - 60 سنة 10%
فقد خصيتين للمراهق 60%
فقد خصيتين للبالغ 35%
فقد خصيتين بعد سن الستين 10%
قلة مائة حسب الحجم والمضاعفات 10%
قلة دموية اصابية 10% 15%
درن البربخ وخصية واحدة 10% 15%
درن البربخ وخصيتين 20% 40%
درن البربخ من ناحية او ناحيتين مع اصابة البرستاتا والحويصلة المنوية 40% 50%
فقد الرحم 30%
تغيير في وضع الرحم 20%
سقوط الرحم او المهبل حالة خفيفة صفر% 5%

اثر الالتنام

اثر التنام لحركة الطرف العلوي :
العضد ملتصق بالجسم 30 - 40 25 - 30%
الكب 10 درجات الى 45 درجة 20 - 30 25 - 15%
الكب من 45 درجة الى 90 درجة 20 15%
الكب لغاية 90 درجة ولكن مع عدم القدرة على رفع الذراع 10% 8%

اثر التنام المرفق مقيدة حركة البسط

لزواية 135 درجة 10% 8%
لزواية 90 درجة 20% 15%
لزواية 45 درجة 40% 35%
لاقل من 45 درجة يكون الساعد في حالة ثني لزواية واحدة 50% 40%

اثر التنام بخلفية الركبة مقيد حركة البسط

من 135 الى 170 درجة 30% 10%
من 90 الى 135 درجة 50% 30%
من 90 درجة او اقل 50% 60%
واثر التنام براحة القدم محدثة انحراف حافظه حسب الاتساع 10% 40%

اثره التئام مؤلمة ومتقرحة حسب الموضوع والانتساع 5% 25%

التهاب نخاعي عظمي مزمن

ناسور واحد او متعدد ومتكرر 20% 40%

التهاب عظمي درني

التهاب عظمي مع ناسور حسب الموضع 20% 40%

الاورام

غدد درنية

1. غدد درنية متقيحة محدثة مضضا والاما بسيطة صفر % 20%
2. غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير 20% 40%

الاورام الخبيثة

تقدر العاهة حسب العجز الناشيء من التداخل 40% 90%
الجراحي العلاجي بسبب بتر الاصابع او طرف
او بحسب انتكاس الحالة عقب العملية او عدم امكان اجراء العملية

الزهري

الزهري كمرض مهني 50%

مبادئ عامة :

يراعى عند تقدير النسب المئوية لدرجات العجز الناشئة عن الاصابات ان هذا التقدير يختلف باختلاف عدة عوامل وهي :

1. سن المصاب .
2. المهنة او الحرفة .
3. وجود حالة مرضية سابقة بالعضو المصاب .
4. العاهات المصحوبة بتشويه ينص في القرار الصادر ان هذه النسبة قاصرة على العاهة دون التشويه .